UTILISATION DES POMMES DE TERRE DESHYDRATÉES ET FRAICHES DANS L'ALIMENTATION DU PORC EN CROISSANCE, EN COMPARAISON AVEC L'ORGE

Y. HENRY et A. RÉRAT

avec la collaboration technique de J.-P. TURC, H. BOUSQUET, P. JORRO et P. VAUGELADE

*Station de Recherches sur l'Élevage des Porcs,
Centre national de Recherches zootechniques, 78 - Jouy-en-Josas*

SOMMAIRE

L'emploi des pommes de terre déshydratées et fraîches dans l'alimentation du porc en croissance, par référence à un régime à base d'orge, a fait l'objet de deux expériences réalisées, l'une en lots et l'autre en cages de digestibilité. Lorsque les animaux sont nourris suivant un système LEHMANN modifié comportant l'administration de 1 500 g d'un aliment concentré contenant 17 p. 100 de matières azotées totales en complément de pommes de terre ou d'orge à volonté, les meilleures performances de croissance sont réalisées par le lot recevant le régime à base d'orge seule. Cependant, dans le cas d'administration de pommes de terre fraîchement cuites, l'indice de consommation exprimé en kg de matière sèche par kg de gain est comparable à celui obtenu avec l'orge et les carcasses sont plus maigres. La consommation de pommes de terre selon ce mode de rationnement représente environ 40 p. 100 de la consommation totale de matière sèche. Par ailleurs, l'introduction de pommes de terre déshydratées dans le régime provoque, par rapport aux tubercules frais, des performances moindres en ce qui concerne à la fois la vitesse de croissance, l'indice de consommation et la qualité des carcasses. La valeur de remplacement du produit déshydraté est de 0,8 kg d'orge (ou UF) par kg contre 0,27 kg d'orge par kg de tubercules frais (soit respectivement 0,9 et 1,1 UF par kg de matière sèche) ; on peut toutefois penser que la moindre valeur du produit déshydraté par rapport au produit frais est due au moins partiellement à une préparation défectueuse (absence de lavage des tubercules, surchauffe au moment de la déshydratation).

INTRODUCTION

L'existence d'excédents plus ou moins importants de pommes de terre dans les zones spécialisées de production a conduit à rechercher une solution commode en vue de leur utilisation en alimentation animale, et plus particulièrement dans l'alimentation du Porc. C'est ainsi qu'il a été envisagé de procéder à leur déshydratation. Cependant, on peut se demander si une telle technique permet de conserver l'inté-

gralité de la valeur nutritive du produit initial. La présente étude a précisément pour objet de déterminer la valeur alimentaire des pommes de terre déshydratées et leur limite d'utilisation, en comparaison avec les pommes de terre fraîchement cuites et un aliment concentré complet à base d'orge.

TECHNIQUES EXPÉRIMENTALES ET MATÉRIEL UTILISÉ

Au cours du premier semestre de l'année 1965, il a été procédé à deux expériences, la première en lots, la deuxième en cages de digestibilité, portant sur l'étude comparée de l'emploi des pommes de terre déshydratées et fraîches dans l'alimentation du porc en croissance.

Les deux lots de pommes de terre déshydratées et fraîches proviennent d'une même récolte ; il s'agit de grenailles de la variété *Binje*. La déshydratation a été réalisée par les soins de l'Institut technique de la Pomme de Terre, à l'aide d'un séchoir à luzerne de type rotatif ; les tubercules, non lavés et broyés à l'état de fines particules de 3 à 5 mm, sont soumis au cours de leur progression dans l'appareil à une température variant entre 600°C à l'entrée et 120-150°C à la sortie. Le produit obtenu (1 kg pour 5 kg de tubercules frais) se présente sous la forme d'une poudre grossière de couleur brun noirâtre, qui semble avoir subi un début de calcination à la suite d'une chauffe irrégulière. Après passage dans un broyeur à marteaux, ce produit est réduit à l'état d'une poudre fine qui se mélange facilement au reste de la ration. Quant aux pommes de terre fraîches, conservées sur caillebotis pendant toute la durée de l'expérience, elles sont cuites à la vapeur au fur et à mesure des besoins à l'aide d'un cuiseur électrique.

1^o Expérience en lots (A)

Trois lots de 13 porcs de race *Large White*, dont 6 mâles et 7 femelles, d'un poids moyen initial de 30 kg et provenant du troupeau expérimental de Jouy-en-Josas, sont constitués en tenant compte du sexe, de l'âge et du poids. Ils sont élevés en loges individuelles et nourris selon le système LEHMANN ; les quantités d'aliment concentré azoté et d'orge sont déduites d'expériences antérieures sur les betteraves à haute teneur en matière sèche (RÉRAT et HENRY, 1964, 1965 *a* et *b*) : pratiquement on distribue chaque jour 300 g d'un aliment concentré azoté renfermant 44 p. 100 de matières azotées totales et, suivant les lots :

— I : de l'orge volonté,

— II : 1 200 g d'orge et des pommes de terre déshydratées à volonté, dès que les animaux ingèrent la totalité de leur ration concentrée.

— III : 1 200 g d'orge et des pommes de terre fraîches à volonté dans les mêmes conditions que précédemment.

Le concentré azoté, l'orge et les pommes de terre sont administrés en 3 repas courts de 20 à 30 minutes. Les aliments secs sont mélangés avant la distribution et humidifiés, à raison de 3 parties d'eau pour une partie d'aliment. Dans tous les cas, les animaux reçoivent de l'eau à volonté.

Au cours de la croissance, il est procédé à la pesée des animaux à intervalles réguliers (tous les 14 jours) et à l'enregistrement quotidien des quantités de nourriture consommées. Les animaux sont abattus au poids de 100 kg ; les modalités expérimentales concernant la découpe des carcasses et les critères retenus ont été décrits dans une publication antérieure (RÉRAT et HENRY, 1964).

2^o Expériences en cages de digestibilité (B)

Six porcs mâles castrés, de race *Large White* et d'un poids moyen initial de 40,2 kg, sont placés en cages de digestibilité et soumis, par groupe de 2, à l'un des trois traitements précédents (I, II, III), suivant le dispositif du carré latin, afin d'estimer la valeur d'utilisation digestive des éléments énergétiques et azotés de chacun des trois aliments par la méthode de la différence (tabl. 1).

Au cours d'une première période de 14 jours, les animaux reçoivent quotidiennement 1 500 g d'un régime de base (RB) composé de 300 g de concentré azoté et 1 200 g d'orge. Pendant les 3 périodes suivantes, de même durée que la précédente, on distribue, en plus du régime de base, une quantité équivalente de matière sèche de chacun des trois aliments : soit 800 g d'orge (traitement I), 800 g de pommes de terre déshydratées (traitement II) ou l'équivalent en matière sèche de pommes de terre fraîchement cuites (traitement III). Une dernière période est consacrée au régime de base (RB) seul dans les mêmes conditions que la première, afin de contrôler l'évolution des critères d'utilisation digestive des éléments énergétiques et azotés du régime en fonction de l'âge ou du poids vif. La durée de chaque période (14 jours) a été choisie de façon à aménager une période de transition de 8 jours suivie d'une période de collecte de 6 jours.

La veille de chaque période, on procède à la pesée et à l'ensachage de la totalité des rations journalières correspondantes, tandis qu'un échantillon est prélevé en vue du contrôle de la teneur en matière sèche des différents aliments. Cependant, en ce qui concerne les pommes de terre cuites, qui sont distribuées à l'état frais, les pesées sont effectuées quotidiennement et la teneur en matière sèche est contrôlée dans les mêmes conditions que précédemment. Les rations journalières sont distribuées en trois repas humides, à raison de trois parties d'eau pour une partie d'aliment sec. Les refus sont recueillis, stockés en chambre froide à 3-4°C, puis séchés à 70°C dans un four à ventilation et pesés à l'issue de chaque période de collecte.

TABLEAU I

Expérience B — Schéma expérimental

Porcs n ^{os}	Périodes				
	1	2	3	4	5
1 et 2	RB	I	II	III	RB
3 et 4	RB	II	III	I	RB
5 et 6	RB	III	I	II	RB

Sur les échantillons représentatifs moyens du régime de base et de chacun des aliments on effectue les déterminations suivantes :

— matière sèche, par séchage à l'étuve à 105°C pour les aliments concentrés et à 70°C pour les tubercules frais ;

— cendres, par incinération au four à 550°C ;

— azote, par la méthode Kjeldahl ;

— énergie, par combustion dans un calorimètre adiabatique « Gallenkamp ».

Les émissions fécales sont recueillies quotidiennement pendant les 6 jours de la période principale, pesées à l'état frais, puis stockées en récipient hermétique dans un congélateur à -15°C. A l'issue de cette période, elles sont homogénéisées dans un mélangeur de marque « Stephan ». La teneur en matière sèche est déterminée sur deux prises aliquotes d'environ 200 g après séchage dans un four à ventilation à 70°C. Une troisième prise aliquote d'environ 500 g est réhomogénéisée dans un mixer « Waring Blendor » après addition d'une quantité connue d'eau, la teneur en matière sèche du produit final étant de l'ordre de 10 à 15 p. 100. Sur des prises aliquotes, on procède à l'analyse de la matière sèche, des cendres, de l'azote et de l'énergie, selon les méthodes exposées ci-dessus. Les animaux sont pesés une fois par semaine.

RÉSULTATS

I. — EXPÉRIENCE A

1^o Composition chimique des aliments et des régimes

Les résultats moyens d'analyse des aliments et du concentré azoté sont rapportés dans le tableau 2. La teneur en matières azotées ($N \times 6,25$) relativement à la matière sèche est sensiblement la même dans le cas des pommes de terre déshydratées et fraîches après cuisson (respectivement 11,7 et 11,6 p. 100) et peu différente de celle de l'orge (11,9 p. 100). Le régime de base, composé de 300 g de concentré azoté et 1 200 g d'orge, renferme ainsi 17,3 p. 100 de matières azotées. Notons par ailleurs que le pourcentage de cendres est nettement plus élevé dans les pommes de terre

déshydratées que dans les pommes de terre fraîches (plus de 9 p. 100 contre 6 p. 100) ; cette différence vient du fait que les tubercules n'avaient pas été lavés avant leur déshydratation.

TABLEAU 2
Composition chimique des aliments et des régimes
(Expérience A)

Aliment	Concentré azoté (1)	Orge	Pommes de terre déshydratées	Pommes de terre fraîches après cuisson
Matière sèche %.....	92,33	89,67	91,55	24,80
<i>Composition % m. sèche</i>				
Matières minérales (cendres).....	20,95	2,90	9,34	6,03
Matières grasses.....	1,98	1,98	0,25	0,36
Mat. azotées (N $\times$ 6,25)...	47,89	11,94	11,67	11,59
Cellulose brute (Weende)...	4,82	4,99	3,75	2,74
Extractif non azoté.....	24,36	78,19	74,99	79,28

(1) Composition p. 100 : tourteau de soja, 22,5 ; tourteau d'arachide, 22,5 ; farine de viande, 22,5 ; farine de poisson du Pérou, 12,5 ; levure de distillerie, 10 ; mélange minéral et vitaminique, 10. La composition du mélange minéral est la suivante en p. 100 : phosphate bicalcique, 41,5, carbonate de calcium, 22,5 ; carbonate de magnésium léger, 10,0 ; chlorure de sodium, 24,0 ; sulfate ferreux (7 H₂O) : 1,0 ; sulfate de manganèse, H₂O, 0,30 ; sulfate de cuivre, 5 H₂O, 0,10 ; carbonate de zinc, 0,50 ; sulfate de cobalt, 7 H₂O, 0,05 ; iodure de potassium, 0,05. La composition du mélange vitaminique a été rapportée par ailleurs (RÉRAT et HENRY, 1964).

2° Croissance et consommation

Les résultats généraux de croissance et de consommation sont présentés dans les tableaux 3, 4 et 5, respectivement pour la période totale 30-100 kg de poids vif et pour les périodes 30-60 kg et 60-100 kg.

a) Vitesse de croissance.

Les animaux recevant de l'orge (lot I) présentent une vitesse de croissance significativement plus élevée que ceux nourris avec des pommes de terre (lots II et III), mais la différence entre ces deux derniers lots n'est pas significative. L'administration de pommes de terre déshydratées et fraîches se traduit par un allongement de la durée totale d'engraissement de 13 et 9 jours respectivement, correspondant à une réduction de la vitesse de croissance de 15 et 12 p. 100.

Les écarts de croissance enregistrés sont surtout importants pendant la période de finition (60-100 kg de poids vif), comme le montre d'ailleurs l'évolution du gain de poids cumulé (fig. 1) ; ceci s'explique par le fait que la part des pommes de terre dans l'ingestion totale est alors plus élevée.

b) Consommation de nourriture.

Pour passer de 30 à 100 kg de poids vif, les animaux ont consommé 108 kg de poudre de pommes de terre ou 336 kg de pommes de terre fraîches ; les consomma-

tions correspondantes de matière sèche représentent respectivement 40 et 37 p. 100 de la consommation totale de matière sèche.

La consommation journalière de matière sèche est significativement plus élevée dans le lot « orge » (I), que dans les lots « pommes de terre » (II et III) soit 2,24 kg contre 2,07 et 1,98 kg. La comparaison de ces deux derniers lots fait ainsi apparaître un accroissement de la consommation de matière sèche chez les animaux recevant des pommes de terre déshydratées, la différence n'étant toutefois pas significative. Par ailleurs, il faut noter que la distribution de poudre de pommes de terre a dû être limitée dans certains cas, par suite d'accès de diarrhée chez les animaux.

TABLEAU 3
Résultats généraux entre 30 et 100 kg de poids vif
(Expérience A)

Lot.....	I	II	III		
Aliment.....	Orge	Pommes de terre déshydratées	Pommes de terre cuites	Écart-type de la moyenne s_x^2 (2)	
Poids initial (kg).....	30,2	32,2	32,4	15,5	
Poids final (kg).....	99,8	98,8	99,4		
Durée (jours).....	104,5	117,9	113,6		
Gain moy./j (g).....	672	568	592		
<i>Consommation totale (kg)</i>					
Matière fraîche:					
Aliment concentré.....	259,1	161,1	156,5	0,039	
Pommes de terre.....	—	108,1	336,2		
Matière sèche:					
Aliment concentré.....	233,1	145,8	141,6		
Pommes de terre.....	—	98,9	82,7		
Totale.....	233,1	244,5	224,3		
<i>Consommation journalière (kg)</i>					
Matière fraîche:					
Aliment concentré.....	2,50 (3)	1,37	1,38	0,057	
Pommes de terre.....	—	0,92	2,97		
Matière sèche:					
Aliment concentré.....	2,24 (4)	1,23	1,25		
Pommes de terre.....	—	0,84	0,73		
Totale.....	2,24	2,07	1,98		
<i>Ind. de consommation (ms) (1)</i>					
Consommation ms pommes de					
terre % ms.....	3,35	3,67	3,35	0,057	
totale.....	—	40,4	36,9		

(1) Quantité de matière sèche consommée (kg)/gain de poids (kg).

(2) Parmi les moyennes analysées statistiquement seules sont différentes au seuil 0,05 celles qui ne sont pas reliées par un trait (test de KEULS, cité par SNEDECOR, 1956).

(3) dont 0,27 de concentré azoté.

(4) dont 0,25 de concentré azoté.

L'évolution de la consommation journalière de pommes de terre déshydratées et fraîches est représentée graphiquement dans les figures 2 et 3. La quantité de pommes de terre déshydratées augmente progressivement de 200 g par jour à 35 kg de poids vif à plus de 1,500 kg à 90 kg. La quantité de pommes de terre fraîches augmente de la même façon de 0,7 kg à 35 kg de poids vif à 5,2 kg à 90 kg ; en pourcentage du poids, elle augmente rapidement à partir de 2 p. 100 à 35 kg pour plafonner aux environs de 5 à 6 p. 100 au-delà de 60 kg de poids vif.

Si l'on considère l'évolution de la quantité journalière de matière sèche ingérée, on constate que les écarts de consommation entre les lots « orge » et « pommes de terre » sont d'autant plus importants que le poids vif augmente (fig. 4 a) ; en outre, la consommation de matière sèche de pommes de terre est plus faible à l'état frais

TABLEAU 4
Résultats entre 30 et 60 kg de poids vif
(Expérience A)

Lot	I	II	III
Aliments.....	Orge	Pommes de terre déshydratées	Pommes de terre cuites
Poids initial (kg).....	30,2	32,2	32,4
Poids final (kg).....	58,8	60,0	60,2
Durée (j).....	53,8	56,0	54,9
Gain moy/j (g)	540	500	514
<i>Consommation totale (kg)</i>			
Matière fraîche :			
Aliment concentré	100,4	74,9	74,8
Pommes de terre.....	—	28,7	91,8
Matière sèche :			
Aliment concentré	90,7	68,1	68,0
Pommes de terre.....	—	26,9	22,4
Totale	—	95,0	90,4
<i>Consommation journalière (kg)</i>			
Matière fraîche :			
Aliment concentré	1,89 ⁽¹⁾	1,34	1,36
Pommes de terre.....	—	0,52	1,71
Matière sèche :			
Aliment concentré	1,71 ⁽²⁾	1,23	1,24
Pommes de terre.....	—	0,49	0,42
Totale	1,71	1,72	1,66
<i>Ind. de consommation (ms)</i>	3,20	3,42	3,25
Consommation matière sèche pommes de terre	—		
% matière sèche totale	—	28,3	24,8

⁽¹⁾ dont 0,26 de concentré azoté.

⁽²⁾ dont 0,24 de concentré azoté.

que sous forme déshydratée. Les mêmes différences apparaissent si l'on exprime la quantité de matière sèche ingérée en pourcentage du poids vif (fig. 4 b) ; alors que dans le lot « orge » elle se situe pratiquement aux environs de 4 p. 100, dans le lot « pommes de terre », elle subit une diminution sensible entre 35 et 90 kg, passant ainsi respectivement de plus de 4 p. 100 à moins de 3 p. 100 du poids vif.

En définitive, la part des pommes de terre dans la consommation totale de matière sèche croît à mesure que les animaux augmentent de poids, d'un peu plus de 10 p. 100 à 35 kg à plus de 50 p. 100 aux alentours de 100 kg (fig. 5) ; de plus, elle est légèrement plus élevée lorsque les pommes de terre sont administrées sous forme déshydratée.

c) *Indice de consommation.*

Afin de comparer les aliments entre eux, l'indice de consommation a été exprimé

TABLEAU 5
Résultats entre 60 et 100 kg de poids vif
(Expérience A)

Lot.....	I	II	III
Aliment.....	Orge	Pommes de terre déshydratées	Pommes de terre cuites
Poids initial (kg).....	58,8	60,0	60,2
Poids final (kg).....	99,8	98,8	99,4
Durée (j).....	50,6	61,9	58,7
Gain moy./j (g).....	822	632	672
<i>Consommation totale (kg)</i>			
Matière fraîche :			
Aliment concentré.....	158,7	86,2	81,7
Pommes de terre.....	—	79,4	244,4
Matière sèche :			
Aliment concentré.....	142,2	77,5	73,4
Pommes de terre.....	—	71,7	60,6
Totale.....	142,2	149,2	134,0
<i>Consommation journalière (kg)</i>			
Matière fraîche :			
Aliment concentré.....	3,16 ⁽¹⁾	1,39	1,39
Pommes de terre.....	—	1,30	4,20
Matière sèche :			
Aliment concentré.....	2,83 ⁽²⁾	1,25	1,25
Pommes de terre.....	—	1,17	1,04
Totale.....	2,83	2,42	2,29
<i>Ind. de consommation (ms)</i>	3,47	3,84	3,43
Matière sèche Pommes de terre % matière sèche totale.....	—	48,1	45,2

(1) dont 0,28 de concentré azoté.

(2) dont 0,26 de concentré azoté.

en matière sèche consommée (kg) par unité de gain de poids vif (kg). Les valeurs ainsi obtenues ne font apparaître aucune différence entre les lots « orge » et « pommes de terre fraîches », qu'il s'agisse de la période totale ou des périodes 30-60 kg et

FIG. 1. — Évolution du gain de poids cumulé
● — orge ; ■ — PdT déshydratées ; □ — PdT fraîches.

FIG. 2. — Consommation journalière de pommes de terre déshydratées en fonction du poids vif

60-100 kg de poids vif ; par contre, l'efficacité globale de la ration est significativement plus faible dans le lot « pommes de terre déshydratées », l'indice de consommation étant de 3,67 contre 3,35 dans les deux autres lots entre 30 et 100 kg de poids vif.

FIG. 3. — Consommation journalière de pommes de terre fraîches en fonction du poids vif
a) en quantité absolue, kg/j ;
b) en pourcentage du poids vif.

FIG. 4. — Consommation journalière de matière sèche en fonction du poids vif
a) en quantité absolue, kg/j ;
b) en pourcentage du poids vif.
● — orge ; ■ — PdT déshydratées ; □ — PdT fraîches.
--- — aliment concentré complémentaire

A partir des résultats précédents et connaissant les parts respectives des pommes de terre et de l'orge dans la consommation totale de matière sèche, il est possible de calculer la valeur de remplacement des pommes de terre déshydratées et fraîches vis-à-vis de l'orge, pris comme aliment de référence, selon la méthode de substitution (ARMSBY, 1922), utilisée antérieurement avec la betterave (RÉRAT et HENRY, 1964). Bien entendu, ce mode d'estimation n'est exact que dans la mesure où la part de l'entretien dans le besoin global est la même pour les trois lots, ce qui n'est pas le cas en raison des différences dans l'intensité de croissance. Compte tenu de cette restriction, nous pouvons procéder à une estimation approchée de la valeur de rem-

FIG. 5. — Consommation de pommes de terre en pourcentage de la matière sèche totale

■ — PdT déshydratées ;
□ — PdT fraîches.

placement à partir des quantités d'aliments nécessaires pour fournir un kilogramme de gain de poids ; le détail du calcul est décrit dans le tableau 6. Les quantités de pommes de terre déshydratées et fraîches équivalentes à 1 kg d'orge (ou UF) sont respectivement 1,25 et 3,64 kg. Les valeurs fourragères correspondantes sont respectivement 0,80 et 0,27 UF par kg d'aliment frais, ou 0,87 et 1,10 UF par kg de matière sèche. En définitive, la déshydratation de la pomme de terre entraîne une diminution de la valeur fourragère d'environ 20 p. 100, ce qui peut être attribué à plusieurs causes dont il est fait état dans la discussion.

3° Composition corporelle

L'examen du tableau 7 fait ressortir des différences importantes au niveau de la composition corporelle selon le type d'aliment utilisé. Le rendement des carcasses est significativement plus élevé dans le lot « orge » que dans les lots « pommes de terre ». Le pourcentage de morceaux nobles (jambon + longe) dans la carcasse

TABLEAU 6

Valeur de remplacement de la pomme de terre par rapport à l'orge
(Expérience A)

Lot	I	II	III
Nature de l'aliment	Orge	P. de terre déshyd.	P. de terre fraîches
Quantités d'aliments nécessaires pour fabriquer 1 kg de gain de poids (kg) :			
aliment concentré.....	3,72	2,42	2,34
pommes de terre.....	—	1,62	5,03
Économie d'aliment concentré (orge) par rapport au lot A (kg).....		1,30	1,38
Quantité de pomme de terre équivalente à 1 kg d'orge.....		1,25	3,64
Équivalent orge de 1 kg de pommes de terre.....		0,80	0,27
Équivalent orge de 1 kg de mat. sèche de pommes de terre.....		0,87	1,10

TABLEAU 7

Résultats concernant la composition corporelle
(Expérience A)

Lot	I	II	III	Écart-type de la moyenne s_x
Aliment	Orge	Pommes de terre déshydratées	Pommes de terre cuites	
Poids vif final (kg).....	99,8	98,8	99,4	0,42
Poids net (kg).....	72,2	70,1	69,9	
Rendement : poids vif % poids net.....	72,26	70,93	70,29	
Jambon % poids net.....	21,43	22,06	22,54	0,58
Longe % poids net.....	27,23	27,91	29,85	
(Jambon + Longe) % poids net.....	48,68	50,01	52,39	
(Bardière + Panne) % poids net.....	19,82	19,32	17,10	0,70
Ép. lard $\left(\frac{\text{Rein} + \text{Dos}}{2}\right)$, mm.....	30,7	28,9	26,2	1,4
Longueur, cm.....	95,7	96,0	95,8	

Seules les moyennes non réunies par un trait sont significativement différentes au seuil 0,05 (test de KEULS, cité par SNEDECOR, 1956).

est significativement plus élevé chez les animaux recevant des pommes de terre fraîches que chez ceux recevant de l'orge ou des pommes de terre séchées ; inversement, le pourcentage de morceaux gras (bardière + panne) dans la carcasse est plus faible. La même tendance se manifeste au niveau de l'épaisseur du lard dorsal ; cependant la grande variabilité de ce critère ne permet pas de déceler un écart significatif.

II. — EXPÉRIENCE B

Les résultats généraux de digestibilité sont présentés dans le tableau 9. Ils concernent quatre animaux seulement sur les six initialement prévus dans le protocole. En effet deux porcs ont été atteints de diarrhées intermittentes, de sorte qu'il n'a pas été possible dans ce cas de procéder à une collecte quantitative des fèces.

TABLEAU 8

Résultats d'analyse du régime de base et des aliments
(Expérience B)

	Régime de base (RB)	Orge	Pommes de terre séchées	Pommes de terre fraîchement cuites
Matière sèche %.....	87,60	87,34	88,23	24,40
Matière organique % matière sèche.....	93,76	97,05	91,05	95,11
N % matière sèche.....	3,13	2,00	1,98	1,70
Énergie brute, kcal/g matière sèche.....	4 496	4 572	4 145	4 363

A partir des résultats des périodes 1 et 5, nous avons ainsi calculé les coefficients d'utilisation digestive apparents (C. U. D.) des éléments énergétiques et azotés du régime de base (tabl. 10). Les valeurs trouvées pour les C. U. D. de la matière sèche, de la matière organique et de l'énergie sont pratiquement les mêmes au début et à la fin de l'expérience, alors que le poids vif moyen des animaux augmente de 40 à 70 kg ; les moyennes correspondantes sont respectivement 82,4, 84,7 et 83,1 pour la matière sèche, la matière organique et l'énergie, tandis que la valeur énergétique du régime de base, exprimée en énergie digestible, est de $3\,739 \pm 9,5$ kcal/kg de matière sèche. Par contre, si l'on considère les matières azotées, on constate que le C. U. D. apparent a tendance à augmenter lorsque le poids vif s'élève de 40 à 70 kg, les valeurs moyennes étant respectivement 81,1 et 83,4.

Connaissant les coefficients d'utilisation digestive du régime de base, il est possible d'estimer, par la méthode de la différence, les coefficients correspondants des aliments (orge, pommes de terre déshydratées et pommes de terre fraîches). Les valeurs ainsi calculées sont rapportées dans le tableau 11. Comme on peut le constater, les pommes de terre fraîches présentent une digestibilité de la matière sèche et de l'énergie significativement plus élevée que les pommes de terre déshydratées et

TABLEAU 9
Résultats généraux de digestibilité
(Expérience B)

Porcs	Période	Poids vif moyen (kg)	Gain moyen/j (g)	RB ms/j (g)	Supplément		Énergie brute (kcal/j)	Énergie digestible (kcal/j)	N ingéré/j (g)	N absorbé/j (g)
					nature	ms/j (g)				
1	1	42,5	429	1 258	—	—	5 655	4 666	39,36	32,62
	2	50,7	357	1 257	I	501	7 944	6 429	49,37	38,42
	3	59,0	571	1 260	II	596	8 135	6 747	50,18	36,90
	4	67,0	571	1 267	III	668	8 613	7 295	51,02	39,89
	5	69,0	286	1 284	—	—	5 775	4 787	40,20	33,44
2	1	43,0	571	1 314	—	—	5 909	4 930	41,13	34,28
	2	54,5	1 000	1 308	I	522	8 268	6 779	51,38	41,24
	3	62,0	286	1 298	II	603	8 335	6 936	52,56	39,97
	4	69,5	429	1 293	III	682	8 786	7 516	52,04	41,28
	5	72,0	286	1 303	—	—	5 858	4 905	40,78	34,28
3	1	42,7	500	1 314	—	—	5 909	4 890	41,13	33,24
	2	51,0	286	1 313	II	524	8 075	6 542	51,46	36,69
	3	60,0	571	1 222	III	552	7 907	6 431	47,65	33,26
	4	67,2	500	1 305	I	699	9 063	7 277	54,82	42,27
	5	70,5	142	1 311	—	—	5 893	4 874	41,02	33,77
4	1	41,5	429	1 314	—	—	5 909	4 978	41,13	33,28
	2	48,5	429	1 312	II	524	8 070	6 696	51,43	38,54
	3	56,2	642	1 284	III	682	8 324	7 088	50,13	38,83
	4	66,7	785	1 275	I	682	8 791	7 189	53,54	42,39
	5	68,7	357	1 288	—	—	5 793	4 804	40,32	33,30

TABLEAU 10
Coefficient de digestibilité du régime de base
Expérience B

Porc	Période	Matière sèche	Matière org.	Énergie	Azote	Énergie digestible (kcal/kg m. s.)
1	1	82,0	84,3	82,5	82,9	3 710
	5	81,8	84,3	82,9	84,3	3 727
2	1	82,9	84,8	83,4	83,8	3 752
	5	82,7	84,9	83,7	84,1	3 765
3	1	82,1	84,3	82,8	80,8	3 721
	5	81,7	85,0	82,7	82,3	3 719
4	1	83,1	85,8	84,2	80,9	3 788
	5	82,1	84,5	82,9	82,6	3 729
Moyenne		82,4 ± 0,25 (2)	84,7 ± 0,18	83,1 ± 0,20	82,7 (1) ± 0,48	3 739 ± 9,5

(1) Moyenne pour la période 1 : 82,1 ± 0,74 et pour la période 5 : 83,3 ± 0,51.

(2) Écart-type de la moyenne.

TABLEAU II
Digestibilité comparée de l'orge et de la pomme de terre
(Expérience B)

	Orge (I)	Pommes de terre déshy- dratées (II)	Pommes de terre fraîches (III)	Signification statistique	
				s_x (1)	Comparaison des moyennes (2)
CUD matière sèche	78,9 ± 1,11	81,5 ± 1,10	87,2 ± 2,40	0,87	III II I
CUD matière organique	79,2 ± 1,70	84,6 ± 1,52	87,4 ± 2,40	0,93	III II I
CUD énergie	77,2 ± 0,62	80,9 ± 1,56	85,4 ± 2,56	1,16	III II I
CUD azoté	65,3 ± 1,59	35,4 ± 6,35	49,8 ± 9,93	6,40	I III II
Énergie digestible					
kcal/kg matière sèche	3 531 ± 29	3 352 ± 65	3 761 ± 117	51	III I II
kcal/kg aliment	3 084	2 957	918		

(1) s_x : Écart-type de la moyenne au seuil 0,05.

(2) Seules les moyennes non réunies par un trait sont significativement différentes au seuil 0,05 (test de KEULS, cité par SNEDECOR, 1956).

Nota. Les CUD de la matière sèche, de la matière organique et de l'énergie ont été calculés à partir de la valeur moyenne du CUD correspondant du Régime de Base. En ce qui concerne les matières azotées, le même calcul a été effectué à partir du CUD de la période adjacente pour les périodes extrêmes et à partir du CUD moyen pour la période intermédiaire.

l'orge, l'écart entre ces deux derniers aliments n'étant pas significatif. Mais si l'on considère la digestibilité de la matière organique, les pommes de terre fraîches et déshydratées se révèlent supérieures à l'orge et ne sont pas significativement différentes. Les valeurs énergétiques, exprimées en énergie digestible par kg de matière sèche, sont respectivement 3 531, 3 352 et 3 761 kcal pour l'orge, les pommes de terre déshydratées et les pommes de terre fraîches, soit par kg d'aliment 3 084, 2 957 et 918 kcal digestibles. Par ailleurs, la comparaison des C. U. D. des matières azotées fait ressortir des différences importantes d'un aliment à l'autre ; malgré la grande variabilité de ce critère, la valeur la plus élevée est obtenue pour l'orge (65,3) et la plus faible pour les pommes de terre déshydratées (35,4 contre 49,8 pour les tubercules frais).

TABLEAU 12

Consommations moyennes journalières d'énergie et de matières azotées digestibles

Lot.....	I	II	III
Aliments.....	Orge	PdT déshydratées	PdT fraîches
Matières azotées digestibles (g/j).....	274	231	242
Énergie, (kcal dig./j).....	8 163	7 415	7 419
M. azot. dig. (g/1 000 kcal dig.).....	33,6	31,2	32,6

A partir des coefficients de digestibilité des éléments énergétiques et azotés, nous avons calculé, pour les trois lots de l'expérience A, les consommations moyennes journalières de matières azotées digestibles et d'énergie digestible (tabl. 12) ; on peut remarquer que les consommations des lots « pommes de terre » sont nettement plus faibles que celles du lot « orge ». De plus, la comparaison des lots « orge » et « pommes de terre déshydratées » fait apparaître dans ce dernier un déficit relatif de matières azotées par rapport à l'énergie : 2,4 g de matières azotées digestibles pour 1 000 kcal digestibles, soit 18 g pour la ration moyenne journalière. Ce déficit peut être compensé par un apport complémentaire de 350 g de concentré azoté, au lieu de 300 g, ce qui revient à élever le taux de matières azotées totales dans les 1 500 g du régime de base de 17,5 à 18,5 p. 100.

DISCUSSION

L'introduction de pommes de terre cuites dans l'alimentation du porc en croissance provoque une diminution sensible de la consommation journalière de matière sèche, et du gain de poids vif, par référence à un régime exclusivement concentré. Les résultats ainsi obtenus confirment les observations antérieurement formulées à ce sujet par LEROY, ZELTER et FÉVRIER (1952). Comme l'ont souligné les auteurs précédents, la différence entre l'utilisation de l'orge et celle des pommes de terre

cuites provient certainement de la plus grande lenteur avec laquelle les animaux consomment les tubercules. Cette lenteur devient, lorsque l'animal dépasse 50 à 60 kg de poids vif, une cause de diminution de la consommation, ce qui explique la réduction comparée du gain de poids ; en outre la dépense énergétique liée au repas augmente (LEROY, 1965). Le même phénomène a été observé par ailleurs dans le cas de la betterave (RÉRAT et HENRY, 1964). Pour pallier ce déficit énergétique, il est nécessaire de prévoir un apport suffisant d'aliment concentré complémentaire. Or, d'après un certain nombre d'auteurs (PIEPER, 1962 ; SEEFELDT, 1962 ; ECKHOFF, 1963 ; FENDER et *al.*, 1963 ; LANTZSCH et *al.*, 1964 ; HOSER, 1965), le niveau de complémentation préconisé dans la méthode LEHMANN classique (LEHMANN, 1929), soit 1 kg d'aliment concentré, s'est révélé insuffisant pour obtenir une croissance satisfaisante, la quantité généralement recommandée étant de 1,500 kg. C'est précisément ce niveau de complémentation qui a été choisi dans la présente étude ; il paraît cependant insuffisant puisque les performances de croissance ne sont pas maximales. Quoi qu'il en soit, les pommes de terre fraîches présentent une valeur fourragère relativement élevée, de l'ordre de 1,1 UF par kg de matière sèche, et comparable à celle trouvée antérieurement par LEROY, ZELTER et FÉVRIER (1952). Étant donné par ailleurs que les matières azotées de la pomme de terre sont mieux équilibrées que celles de l'orge en certains aminoacides indispensables, en particulier la lysine (MANGOLD et COLUMBUS, 1938 ; HUTCHINSON et *al.*, 1943 ; KASTELL, 1957 ; HUGHES, 1958 ; SCHUPHAN, 1959), on peut s'attendre à ce que les carcasses obtenues soient plus maigres, en raison précisément d'un meilleur équilibre entre l'énergie et les aminoacides indispensables. La diminution du rendement des carcasses, consécutive à l'ingestion de pommes de terre, est également un phénomène connu, par suite d'un développement plus important du tractus digestif (LEROY, ZELTER et FÉVRIER, 1952 ; RICHTER et *al.*, 1956 ; WENIGER, 1956). Notons d'ailleurs que cette diminution du rendement se retrouve avec le produit séché ; la même constatation a été faite par FRIEND et *al.* (1963) dans le cas de la pulpe de pomme de terre séchée.

Si l'on examine les résultats de digestibilité des matières azotées, on est frappé par la faiblesse des valeurs observées, en comparaison avec celles qu'on peut trouver dans la littérature ; il en est ainsi aussi bien de l'orge que des pommes de terre fraîches ou déshydratées. Il est possible que ces écarts systématiques soient dus à la méthode de calcul employée. Ainsi, le C.U.D des matières azotées du régime de base, qui est composé essentiellement d'orge, est nettement plus élevé que celui de l'orge elle-même (82,7 contre 65,3) ; le même écart apparaît dans les résultats de NEHRING et *al.* (1960) qui, utilisant la même méthode par différence trouvent pour l'orge un C.U.D des matières azotées de 71,2 p. 100 contre 82,3 pour le régime de base, ce dernier renfermant 63 p. 100 d'orge et 23 p. 100 d'avoine. On peut dès lors conclure à une surestimation du C.U.D azoté du régime de base, ce qui expliquerait les faibles valeurs obtenues par différence.

L'influence de la déshydratation sur la valeur nutritive de la pomme de terre a fait l'objet d'un grand nombre de travaux dont les premiers, réalisés par KELLNER, remontent à 1908 (KELLNER et *al.*, 1908 ; KELLNER et NEUMANN, 1910). En réalité, les résultats obtenus sont plus ou moins variables selon la nature du traitement appliqué. Ainsi, deux modes de déshydratation ont été utilisés, suivant que les tubercules sont étuvés, puis séchés sur cylindre à l'état de flocons, ou simplement pressés à l'état cru pour éliminer l'eau, puis séchés à l'état de cossettes ; ces traitements ont

été décrits en détail par FINGERLING (1933), STAHL et FRIEDRICH (1940), WOODMAN et EVANS (1943), WOHLBIER et NECKERMAN (1952). D'une manière générale, il a été observé que les pommes de terre séchées en flocons présentent une valeur nutritive élevée, comparable à celle des tubercules frais après cuisson ou à celle des céréales les plus énergétiques (maïs), et supérieure à celle des cossettes séchées. C'est ce qui ressort des travaux de STAHL *et al.* (1932), FINGERLING (1933), HUTCHINSON *et al.*, (1943), GRASHUIS et DE MAN (1947) ; BIELINSKI et BIELINSKA (1954), LAUBE et WEISSBACH (1961-62). WOODMAN et EVANS (1943), McMILLEN *et al.* (1948), HUSBY et PRESTHEGGE (1952) ont montré également que des pommes de terre convenablement déshydratées peuvent se substituer aux céréales (orge), à quantité égale et suivant une proportion représentant 30 p. 100 de la ration totale, sans qu'il en résulte des effets défavorables sur la vitesse de croissance, l'indice de consommation ou la qualité des carcasses. Notons cependant, d'après McMILLEN *et al.*, que cette utilisation est meilleure lorsque les animaux sont plus âgés (au-delà de 70 kg de poids vif) et lorsque le taux d'incorporation dans le régime est inférieur à 50 p. 100 ; au-delà il s'ensuit une diminution de la valeur de remplacement vis-à-vis de l'orge. ZAUSCH et HOLZSCHUCH (1960) rapportent de leur côté une mauvaise croissance et des troubles digestifs (diarrhée) avec un régime renfermant 40 p. 100 de pommes de terre déshydratées. Plus récemment, HOFMANN (1960, 1965) enregistre avec des pommes de terre déshydratées des performances légèrement plus faibles qu'avec un aliment concentré complet ou des pommes de terre cuites ; cependant, les écarts observés ne sont pas significatifs et doivent être attribués principalement au procédé de dessiccation employé.

Si l'on en juge d'après les résultats obtenus dans la présente expérience, on peut en déduire que les pommes de terre séchées à l'état de cossettes crues puis réduites en farine sont moins bien valorisées que les tubercules frais et cuits. Sans doute la consommation de matière sèche est-elle plus élevée qu'avec les pommes de terre fraîches, par suite de l'élimination de l'important volume d'eau contenu dans ces dernières, mais elle demeure plus faible que dans le lot témoin à base d'orge. Pour expliquer cette action dépressive des pommes de terre séchées sur l'appétit, phénomène observé également par d'autres auteurs, dont HOFMANN (1960), on pourrait incriminer l'équilibre azoté de la ration. En effet, au cours de la déshydratation, il a été observé une chauffe irrégulière entraînant une calcination partielle du produit, et probablement une dénaturation plus ou moins importante des matières azotées. Ceci se traduit en particulier par une légère dépression de la digestibilité de ces dernières, ainsi que l'ont montré WOODMAN et EVANS (1939), HUTCHINSON *et al.* (1943), WOHLBIER et NECKERMAN (1952), HOFMANN (1965). Il est possible également que l'excès de chauffage incriminé ait fait apparaître dans le produit déshydraté des odeurs ou des saveurs peu plaisantes pour le porc. Sur le plan pratique, et compte tenu de la qualité du produit employé, il conviendrait ainsi d'élever légèrement le niveau de complémentation azotée. Par ailleurs, nous devons attribuer à ce traitement la diminution de la valeur énergétique du produit séché : 0,9 UF par kg de matière sèche au lieu de 1,1 UF pour les tubercules frais. Les valeurs énergétiques correspondantes, exprimées en énergie digestible par kg de matière sèche, sont respectivement 3 352 et 3 761 kcal, contre 3 531 kcal pour l'orge ; il est intéressant de noter que cette valeur trouvée pour l'orge est assez proche de celle déterminée par NEHRING et ses collaborateurs (1963) soit 3 510 kcal digestibles par kg de matière

sèche. Pour expliquer la perte d'énergie ainsi provoquée par la déshydratation, on pourrait invoquer une cuisson irrégulière de l'amidon. De nombreux auteurs, parmi lesquels BOLLMANN (1932), FRENS (1943), BRAUDE et MITCHELL (1951), BREIREM et HUSBY (1951), LEROY, ZELTER et FÉVRIER (1952), MARTIN et BUYSSE (1955), ont montré en effet que la valeur nutritive de la pomme de terre dépend étroitement de son degré de cuisson ; au contraire, selon HOFMANN (1960) l'amidon de pommes de terre crues puis séchées serait aussi bien utilisé que l'amidon cuit. Notons également que le produit utilisé dans la présente expérience a été obtenu à partir de tubercules non lavés et renfermant une teneur anormalement élevée en cendres (9 p. 100 de la matière sèche contre 6 p. 100 pour les tubercules frais et lavés), ce qui pourrait entraîner à la fois une diminution de la valeur énergétique proprement dite et une dépression de la digestibilité, laquelle est cependant moins marquée si on la rapporte à la matière organique. On peut donc présumer qu'une préparation correcte (lavage soigné suivi d'une déshydratation à une température modérée) permettrait de mieux valoriser le produit déshydraté et sans doute de lui donner une valeur comparable au produit cuit. C'est ce qui apparaît des travaux récents de KLUSMANN (1962), TEICHMANN (1962), RICHTER, CRANZ et ANTONI (1962), RICHTER et FARRIES (1962), qui n'ont observé aucune différence dans l'utilisation des pommes de terre séchées ou cuites, selon que l'on considère la vitesse de croissance, l'indice de consommation de matière sèche, la digestibilité des éléments énergétiques et azotés, ou les caractéristiques de composition corporelle. Quoi qu'il en soit, si l'on se réfère aux résultats obtenus par ailleurs avec les betteraves (RÉRAT et HENRY, 1964), on peut penser que la valeur de remplacement des pommes de terre déshydratées serait sensiblement améliorée grâce à l'introduction dans le régime d'un taux plus faible que celui utilisé dans la présente étude.

En conclusion, les pommes de terre fraîchement cuites peuvent être introduites avantageusement dans le régime du porc en croissance, selon le système LEHMANN, grâce à un apport complémentaire de 1 500 g d'un aliment concentré renfermant 17 p. 100 de matières azotées totales (soit 300 g d'un concentré azoté dosant 44 p. 100 de matières azotées et 1 200 g d'orge). L'important volume d'eau contenu dans les tubercules constitue le facteur limitant de l'ingestion énergétique et par suite de la vitesse de croissance, comparativement à un régime exclusivement concentré à base d'orge. Quoi qu'il en soit, l'utilisation globale de la ration est comparable et les carcasses obtenues sont plus maigres. La consommation de pommes de terre selon ce mode de rationnement représente environ 40 p. 100 de la consommation totale de matière sèche.

L'emploi de pommes de terre déshydratées, à un même niveau de complémentation énergétique (1 500 g d'aliment concentré), se traduit par des performances moindres que celles obtenues à partir de tubercules frais, tant en ce qui concerne la vitesse de croissance que l'indice de consommation ou la qualité des carcasses. La valeur de remplacement du produit obtenu est de 0,8 kg d'orge (ou UF) par kg contre 0,27 kg d'orge par kg de tubercules frais (soit respectivement 0,9 et 1,1 UF par kg de matière sèche). Cette diminution de la valeur nutritive du produit séché doit être attribuée en premier lieu à une mauvaise préparation (lavage insuffisant, température de dessiccation trop élevée). Remarquons par ailleurs que l'ingestion de pommes de terre déshydratées a été relativement importante, représentant 40 p. 100 de la consommation totale de matière sèche (28 p. 100 entre 30 et 60 kg

de poids vif et 48 p. 100 entre 60 et 100 kg). C'est pourquoi il y a lieu de penser que les performances seraient sensiblement améliorées si l'on introduisait une proportion plus faible de pommes de terre déshydratées en remplacement de l'orge dans l'aliment concentré, par exemple respectivement 15 et 30 p. 100 au cours des périodes 30-60 kg et 60-100 kg de poids vif. On pourrait également envisager une élévation du niveau de complémentation azotée, soit 350 g d'un concentré azoté renfermant 44 p. 100 de matières azotées totales en complément de 1 200 g d'orge ou 1 500 g d'un aliment concentré renfermant 18 à 19 p. 100 de matières azotées totales.

Reçu pour publication en mai 1966.

REMERCIEMENTS

A l'Institut technique de la Pomme de Terre pour nous avoir fourni gracieusement les lots de pommes de terre et pour sa contribution à la réalisation de ces essais.

SUMMARY

USE OF DRIED AND COOKED POTATOES IN COMPARISON TO BARLEY IN FEEDING GROWING PIGS

The use of dried or cooked potatoes in the feeding of growing pigs, in comparison to barley, was the subject of two experiments, one with groups of pigs and one in digestibility crates. In the first experiment (A) three groups of 13 *Large White* pigs of initial liveweight 30 kg were fed to 100 kg liveweight on the Lehmann system, in which they were given daily 300 g concentrate with 44 p. 100 crude protein and, for the respective groups :

- barley to appetite (Group 1) ;
- 1 200 g barley and dried potatoes to appetite (Group 2) ;
- 1 200 g barley and freshly cooked potatoes to appetite (Group 3).

In the second experiment (B) 6 pigs were put in digestibility cages between 40 and 70 kg liveweight and were fed as the groups in the first experiment, in a Latin square design, in order to estimate the digestibility of energy and nitrogen of the feed by difference.

From the results obtained in the interval between 30 and 100 kg liveweight average daily gain in g per day and « index of consumption », intake of dry matter per kg gained, were for groups 1, 2 and 3, respectively, 672 g and 3,35 kg, 568 g and 3,67 kg and 592 g and 3,35 kg. Corresponding values for criteria of carcass composition, carcass yield, percentage lean cuts (ham and loin) and fat cuts (back and belly) in the carcass and mean depth of back fat ($\frac{\text{kidney} + \text{back}}{2}$) in mm were, respectively : Group 1, 72.3, 48.7, 19.8 and 30.7 ; group 2, 70.9, 50.0, 19.3 and 28.9 ; group 3, 70.3, 52.4, 17.1 and 26.2. Percentage digestibility of energy and of crude protein and energy value expressed as kcal digestible energy per kg dry matter were for barley 77.2, 65.3 and 3531, for dried potatoes 80.9, 35.4 and 3352 and for cooked potatoes 85.4, 49.8 and 3761.

Giving fresh potatoes in the diet reduced growth rate compared with barley but the intake of dry matter per kg gained was comparable, and the carcasses were leaner. With this method of feeding potatoes supplied 37 p. 100 of the total intake of dry matter. In contrast, dried potatoes compared with fresh tubers reduced performance as regards growth rate, intake of dry matter per unit gained and carcass quality ; between 30 and 100 kg liveweight the dried product supplied 40 p. 100 of the total intake of dry matter. The replacement value of dried potatoes was 0.8 kg barley (or feed unit) per kg against 0.27 kg barley per kg for fresh tubers, equivalent to 0.9 and 1.1 feed units per kg dry matter. However, the reduced feeding value of the dried potatoes compared with the fresh product could be considered at least in part due to faulty preparation ; the potatoes were not washed, and they were overheated during drying.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- ARMSBY H. P., 1922. *The nutrition of farm animals*, 743 pp. The McMillan Co, N. Y.
- BIELINSKI K., BIELINSKA K., 1951. L'emploi de la pulpe de pommes de terre déshydratée dans l'alimentation du porc (en polonais). *Rocz. Nauk. rol. (B)*, **63**, 297-308.
- BOLLMANN W., 1932. Untersuchungen über die Verdaulichkeit der Nährstoffe von rohen, gedämpften und gedämpfteingesäuerten Kartoffeln am Schwein, am Hammel, an der Milchkuh und am Mastochsen. *Ztschr. Züchtung*, **24**, 330-357.
- BRAUDE R., MITCHELL K. G., 1951. Potatoes for fattening pigs. Comparison of cooked and raw potatoes. *Agriculture*, **57**, 501-506.
- BREIREM K., HUSBY M., 1951. Essais sur l'emploi de l'ensilage de pommes de terre cuites ou crues dans l'alimentation du porc (en norvégien). *Norsk Landbruk*, **17**, 59-64 ; 89-93.
- ECKHOFF, 1963. Das Schwein und die Kartoffel. *Schweinezücht und Schweinemast*, **11** (3), 58-60.
- FENDER M., KIRSCH W., FEWSON D., 1963. Beitrag zur Hackfruchtmast mit Schwein unter besonderer Berücksichtigung des Nährstoff gehaltes der Beifuttermischungen und der Fütterungstechnik. *Z. Tierphysiol. Tierernähr. Futtermittel.*, **18**, 175-180.
- FINGLINGER G., 1933. Der Nährwert von Kartoffelflocken und Kartoffelschnitzeln. *Die Landw. Vers. Sta.*, **114**, 1-112.
- FRENS A. M., 1943. Les propriétés diététiques défavorables des pommes de terre crues pour le porc en croissance (en néerlandais). *Versl. Vereniging Exploitatie Proefinzelboerderij*, Horn, 261-290.
- FRIEND D. W., CUNNINGHAM H. M., NICHOLSON J. W. G., 1963. The feeding value of dried potato pulp for pigs. *Canad. J. Anim. Sci.*, **43**, 241-251.
- GRASHUIS J., DE MAN T. I., 1947. Essais complémentaires sur la valeur nutritive et l'emploi des cossettes de pommes de terre séchées dans l'alimentation du porc (en néerlandais). *Inst. Moderne Veevoeding « Peschothorst »*, Hoogland, 14. pp
- HOFMANN P., 1960. Schweinemastversuch mit Kartoffeltrockenschnitzeln und Kartoffelflocken. *Der kartoffelbau*, **11**, 6.
- HOFMANN P., 1965. Schweinemastversuch mit Kartoffeltrockenschnitzeln. *Bayer Landw. Jb*, **42**, 339-347.
- HOSER S., 1965. Utilisation des pommes de terre ensilées pour l'engraissement des porcs (en polonais). *Przegląd Hodowlany*, **34** (9), 17-19.
- HUGHES B. P., 1958. The aminoacid composition of potato protein and of cooked potato. *Brit. J. Nutr.*, **12**, 188-195.
- HUSBY M., PRESTHEGGE K., 1952. Le sorgho, les caroubes et la poudre de pomme de terre dans l'alimentation du porc (en norvégien). *Landbrukshøgsk. Føringforsøk*. Rapport n° **26**, p. 8.
- HUTCHINSON J. C. D., BACON J. S. D., MACRAE T. F., WORDEN A. N., 1943. The nutritive value of potato protein for the pig. *Biochem. J.*, **37**, 550-562.
- KASTELL A., 1957. Die quantitative Bestimmung der Aminosäuren in Futtermitteln. Das Kartoffel-eiweiss. *Mikrochim. Acta*, 689-698.
- KELLNER O., JUST M., EISENKOLBE P., POPPE M., 1908. Untersuchungen über die Verdaulichkeit getrockneter Kartoffeln. *Landw. Vers. Sta.*, **68**, 39-60.
- KELLNER O., NEUMANN R., 1910. Fütterungsversuche mit Schweinen über die Verdaulichkeit getrockneter Kartoffeln und des entfetteten Sojabohnenmehls. *Land. Vers. Sta.*, **73**, 235-240.
- KLUSMANN W., 1962. *Der kartoffelbau*, **13**, 159-160.
- LANTZSCH H. J., GUTTE J. O., MOLNAR S., LENKEIT W., 1964. Beitrag zur Frage der Fütterungsintensität und Beifuttermenge in der Hackfruchtmast der Schweine. *Z. Tierphysiol. Tierernähr. Futtermittel.*, **19**, 357-363.
- LAUBE W., WEISSBACH F., 1961-62. Untersuchungen an Schweinen über Schmackhaftigkeit, Bekömmlichkeit, Verdaulichkeit und Mastwirkung von walzengetrockneten Kartoffeleiweiss. *Jahr. Arbeitsgemeinschaft Fütterungsberatung*, **4**, 241-252.
- LEHMANN F., 1929. Tierische mehle und Futtermittel aus niederen Tieren. In MANGOLG E. *Nährstoffe und Futtermittel* (1), 498-527, Springer, Berlin.
- LEROY A. M., 1965. Influence de la matière azotée sur la dépense énergétique des animaux. *World. Rev. Anim. Prod.* (3), 31-41.
- LEROY A. M., ZELTER S., FÉVRIER R., 1952. L'utilisation de la pomme de terre pour l'alimentation des animaux domestiques. *Ann. Zootech.*, **1**, 87-145.
- MANGOLD E., COLUMBUS A., 1938. Verdaulichkeit und biologische Wertigkeit von Kartoffeleiweiss beim Schwein. *Landw. Vers. Sta.*, **129**, 12-27.
- MARTIN J., BUYSSE F., 1955. La pomme de terre dans l'alimentation du porc. Comparaison entre les pommes de terre étuvées et les pommes de terre crues réduites en purée. *Rev. Agric., Bruxelles*, **8**, 1135-1158.
- MC MILLEN W. N., BROWN G. A., LUECKE R. W., 1948. Dehydrated potatoes for swine. *Quart. Bull. Michigan Agric. Expt. Sta.*, **30**, 380-382.

- NEHRING K., HOFFMANN L., SCHIEMANN R. 1963. Die energetische Verwertung der Futterstoffe. 3. Die energetische Verwertung der Kraftfutterstoffe durch Schweine. *Arch. Tierernähr.*, **13**, 147-161.
- NEHRING F., SCHIEMANN R., HOFFMANN L., KLIPPEL W., 1960. Die Verwertung der Futterenergie in Abhängigkeit vom Ernährungsniveau. 2. Versuche mit Schweinen. *Arch. Tierernähr.*, **10**, 275-320.
- PIEPER E., 1962. Kartoffelbedarf je Mastschwein. *Tierzüchter*, **14**, 810-812.
- RÉRAT A., HENRY Y., 1964. Utilisation de la betterave « danoise » dans l'alimentation du porc en croissance. I. Recherche d'un plan de rationnement. *Ann. Zootech.*, **13**, 217-236.
- RÉRAT A., HENRY Y., 1965 a. Utilisation de la betterave « danoise » dans l'alimentation du porc en croissance. II. Variations du plan de rationnement et du poids d'abattage. *Ann. Zootech.*, **14**, 371-377.
- RÉRAT A., HENRY Y., 1965 b. Utilisation de la betterave « danoise » dans l'alimentation du porc en croissance. III. Valeur fourragère et digestibilité. *Ann. Zootech.*, **14**, 379-389.
- RICHTER K., CRANZ K. L., OSLAGE H. J., 1956. Vergleichende Untersuchungen über den Einfluss einer unterschiedlichen Fütterung von Schweinen mit Getreide, Kartoffeln, und Zuckerrüben auf Mastentwertung und Schlachtqualität. *Zuchtungskunde*, **28**, 93-104.
- RICHTER K., CRANZ K. L., ANTONI J. J., 1962. Futterwert und Futterwirkung von im Trommeltrockner hergestellten Schnitzeln. *Der Kartoffel Bau*, **13** (9).
- RICHTER K., FARRIES F. E., 1962. Zusammensetzung, Verdaulichkeit und Nährwert von Kartoffelschnitzeln. *Der Kartoffel Bau*, **13** (11).
- SCHUPHAN W., 1952. Studien über essentielle Aminosäuren in Kartoffeln. 2. Die biologische Eiweisswertigkeit der Kartoffel (*Solanum tuberosum* L.) im Ernährungsversuch und Spiegel der essentieller Aminosäuren. *Qual. Plant. Materiae vegetabiles*, **6**, 16-38.
- SEEFELDT G., 1962. Richtigen Einsatz der Kartoffel im Schweinestall. *Schweinezucht. Schweinemast.*, **10**, 219-220.
- SNEDECOR G. W., 1956. *Statistical methods applied to experiments in agriculture and biology*, 5^e éd., 534 p. The Iowa state Univ. Press, Ames, Iowa.
- STAHL W., GÖHNER A., BARTH F., 1932. Welchen wert hat Kartoffelpülpe für die Schweinemast? *Zeitschr. Schweinezucht*, **39**, 229-231.
- STAHL W., FREIDRICH E., 1940. Trocken kartoffelshrot (Verfahren Ing. Maus) im Vergleich zu Kartoffel flocken. *J. ber. Landw.*, **87**, 243-248.
- TEICHMANN W., 1962. *Der Kartoffel Bau*, **13**, 160-161.
- WENIGER J. H., 1957. Weitere Untersuchungen über das Verhalten des Magen Darmkanals des Schweines unter dem Einfluss Verschiedenartiger Ernährung. *Arch. Tierernähr.*, **6**, 223-230.
- WOHLBIER W., NECKERMANN L., 1952. Der Nährwert von Kartoffelflocken und Press Kartoffeln, nach versuchen an Schweinen. *Arch. Tierernähr.*, **2**, 166-176.
- WOODMAN H. E., EVANS R. E., 1939. The composition and digestibility, when fed to pigs and sheep, of potato cosettes and potato meal. *J. agric. Sci.*, **29**, 347-363.
- WOODMAN H. E., EVANS R. E., 1943. Further investigations of the feeding value of artificially dried potatoes, the composition and nutritive value of potato cosettes, potato meal, potato flakes, potato slices and potato dust. *J. agric. Sci.*, **33**, 1-14.
- ZAUSCH M., HOLZSCHUH W., 1960-1961. Getrocknete Kartoffeln bei der Schweinefütterung. *Jahrb. Arbeitsgemeinschaft. Fütterungsberatung.*, **3**, 173-182.