

Note

Evolution de quelques paramètres physico-chimiques du contenu cæcal d'un poney au cours du nycthémère

J. L. TISSERAND, M. CANDAU ⁽¹⁾, A. HOUISTE et C. MASSON
avec la collaboration technique de Catherine CORDELET et F. FAURIE
*Laboratoire de Recherches de la Chaire de Zootechnie de l'E.N.S.S.A.A., I.N.R.A.,
26, boulevard Dr-Petitjean
21016 Dijon Cedex (France)*

Résumé

Sur un poney mâle, muni d'une canule permanente de cæcum, nous avons étudié l'évolution au cours du nycthémère du pH et des concentrations en azote total et ammoniacal ainsi qu'en acides gras volatils du contenu cæcal.

Par rapport à ce qui est connu pour le rumen des Polygastriques, les résultats obtenus montrent que, dans le cæcum du Poney, le pH (7,49) est plus élevé malgré une concentration moindre en azote ammoniacal (69 mg/l). La teneur en acides gras volatils totaux (49 mmole/l) est plus faible avec une très forte proportion molaire d'acide acétique (69 p. 100).

D'une manière générale, le contenu de cæcum paraît beaucoup moins variable au cours de la journée que celui du rumen.

Introduction

La possibilité pour le Cheval, herbivore monogastrique, d'utiliser les glucides membranaires grâce à une digestion microbienne dans son gros intestin est connue de longue date. Cependant peu de travaux ont été entrepris à ce jour pour étudier les fermentations microbiennes dans le cæcum et le côlon de cet animal (ARGENZIO, SOUTHWORTH et STEVENS 1974, HINTZ *et al.* 1971a, HINTZ et SCHRYVER 1972, KERN *et al.* 1973, ROBINSON et SLADE 1974). Celles-ci n'ont pas l'importance de

⁽¹⁾ Actuellement Chaire de Zootechnie E.N.S.A. de Toulouse, 145, avenue de Muret, 31076 Toulouse Cedex.

celles constatées chez les Ruminants mais constituent néanmoins un facteur prédominant de l'utilisation digestive des aliments chez le Cheval.

Afin de compléter nos connaissances dans ce domaine, nous avons entrepris, depuis 1972, au Laboratoire de Recherches de la Chaire de Zootechnie de l'École Nationale Supérieure des Sciences Agronomiques Appliquées (I.N.R.A.), une série d'études sur poneys munis de canule permanente du cæcum. Nous rapportons ici les premières observations effectuées dans le but de mieux connaître les variations de certains paramètres physicochimiques du contenu de cæcum au cours du nyctémère en les comparant en particulier à ceux du rumen du polygastrique.

Matériel et méthodes

1. — *Matériel*

Un poney mâle entier, âgé de sept ans, pesant 150 kg, muni d'une canule permanente du cæcum, reçoit deux repas par jour (à 8 h et 17 h) composés de foin de pré à volonté et de 0,5 kg d'avoine mis à la disposition de l'animal une heure après le début du repas de foin.

L'eau est laissée à la disposition de l'animal en permanence.

2. — *Méthodes*

a) *Technique de fistulation.*

La canule cæcale est mise en place sous anesthésie générale par le penthio-barbital sodique (Nesdonal) après une prémédication avec un tranquillisant. L'intervention commence par une incision cutanée puis musculaire sur une dizaine de centimètres au niveau du creux du flanc droit de l'animal.

Après avoir isolé le péritoine, le cæcum est extériorisé pour la mise en place immédiate de la canule (tube de chlorure de polyvinyle). Pour une meilleure cicatrisation, le segment libre de la canule est placé, grâce à une étroite boutonnière, sur le côté aval de l'incision. Une antibiothérapie post-opératoire est effectuée pendant 4 jours.

b) *Technique de prélèvement.*

Des prélèvements de 100 ml de contenu cæcal sont réalisés à l'aide d'une sonde reliée à une pompe à vide toutes les heures pendant 24 heures et ceci est répété 5 fois à raison d'une journée par semaine.

c) *Mesures.*

Sur chaque prélèvement sont effectuées les mesures suivantes :

- mesure du pH
- dosage de l'azote total (Kjeldahl)
- dosage de l'azote ammoniacal N-NH₃ (méthode Conway)
- dosage de l'azote protéique (obtenu par précipitation à l'acide trichloracétique)
- dosage des acides gras volatils : AGV (par chromatographie en phase gazeuse : colonnes de 3 m long, remplies de chromosorb W. 80-100 m + NPGA 25 p. 100 et acide orthophosphorique 2 p. 100).

TABLEAU I

Teneurs moyennes en azote et en acides gras volatils totaux du contenu de cæcum du poney
Average nitrogen and total volatile fatty acids concentration in the caecum of the pony

Données (Data)	pH	Azote total (mg/l)	Pro-téines (mg/l)	Azote ammoniacal (mg/l)	Acides gras volatils (mmole/l)	Acétique (p. 100)	Propionique (p. 100)	Butyrique (p. 100)
Valeur moyenne (Mean value)	7,49	584	302	69	49	69	23	5,3
Sx	± 0,13	± 80	± 43	± 22	± 9	± 4	± 2	± 0,7




FIG. 1. — Variations du pH et des concentrations en azote ammoniacal, azote protéique et azote total dans le contenu de cæcum de poney au cours de la journée (|—●—|écart-type de la moyenne)

pH values and N-NH₃, protein N and total N concentrations in pony caecum during the day. (|—●—|standard error of the mean).

Résultats — Discussion

Les résultats moyens obtenus au cours des cinq séries de mesures sont résumés dans le tableau 1. Il montre que :

Le pH du contenu de cæcum, pour un régime composé de foin et de céréales, est basique et reste compris entre 7 et 8. Malgré quelques écarts (0,2 à 0,3 pts) entre les mesures à une même heure, il reste relativement stable au cours du nycthémère.




FIG. 2. — Variations de la teneur en acides gras volatils totaux dans le contenu de cæcum de poney et des pourcentages molaires en C_2 , C_3 , C_4 au cours de la journée (—●—|écart-type de la moyenne).

Total volatile fatty acids concentration in the cæcum of the pony and acetic, propionic, butyric molar percentages during the day (—●—|standard error of the mean).

L'azote du contenu de cæcum est composé principalement de protéines (52 p. 100) et son taux varie peu au cours de la période de 24 heures.

La teneur en azote ammoniacal ($N-NH_3$) reste faible (12 p. 100 de l'azote total) mais présente des variations au cours de la journée. Il en est de même de la production d'acides gras volatils (AGV) (50 millimoles par litre) qui sont représentés essentiellement par l'acide acétique (70 p. 100).

Par rapport à ce qui se passe dans le rumen du polygastrique, nous constatons une valeur du pH beaucoup plus élevée dans le cæcum du poney bien que la production d' $N-NH_3$ soit beaucoup plus faible.

La production d'acides gras volatils, pour sa part, est moins importante dans le cæcum du poney que dans le rumen. L'acide acétique y est prédominant, ce qui a déjà été noté par ULYATT *et al.* 1975 dans le cæcum de ruminant.

Les graphiques 1 et 2, qui représentent les variations enregistrées au cours du nyctémère, indiquent que la stabilité du contenu du cæcum est beaucoup plus grande que celle du rumen. Une évolution est enregistrée pour la concentration en AGV et en N-NH₃. Le pH, pour sa part, est peu modifié. Il présente toutefois deux périodes de baisse : la première entre 10 h et 14 h et surtout la seconde entre 20 h et 24 h. L'acidification constatée est imputable à une augmentation de la production d'AGV et surtout à un accroissement des taux d'acides propionique et butyrique durant ces deux périodes.

Par contre, la formation d'N-NH₃ semble décalée dans le temps puisque l'augmentation de la concentration en cet élément se situe entre 16 h et 20 h et surtout entre 0 h et 6 h. Ce dernier phénomène, difficilement explicable, pourrait être dû au fait que l'azote ammoniacal provenant surtout de protéines membranaires ne serait formé et libéré qu'après l'attaque des membranes et notamment la digestion des glucides solubles et de la cellulose. Par contre, l'évolution du pH et des AGV nous incite à penser que les périodes de 10 h à 14 h et surtout de 20 h à 24 h sont des périodes d'activité intense du cæcum par suite de l'arrivée vraisemblable de contenus digestifs consécutifs au repas : 8 h et 17 h.

Ces premières observations sont en accord avec les principaux résultats déjà publiés (HINTZ *et al.* 1971b, KOLB et GÜRTLER 1971, CANDAU et VIGROUX 1974, ROBINSON et SLADE 1974, TISSERAND 1975).

Bien que les valeurs obtenues ne soient que la résultante d'activités différentes telles que : digestion microbienne, absorption des nutriments, rythme de remplissage et de vidange du cæcum, nos résultats permettent de penser que les variations de composition du contenu sont beaucoup moins importantes dans le cæcum du cheval que dans le rumen. Ceci est sans doute imputable au fait que le cæcum ne reçoit que les résidus de la digestion chimique des aliments dans l'intestin grêle (RUCKEBUSCH, VIGROUX, CANDAU, 1976).

Accepté pour publication en mars 1977.

Summary

Variation of some physico-chemical parameters in the cæcum content of a pony during the 24hr-cycle

A pony fitted with a caecum fistula was used to study the variation of pH and N-NH₃, protein-N, total-N and total volatile fatty acid concentrations during the 24hr-cycle.

In comparison with results generally obtained on the polygastric rumen, the pH of the pony caecum (7.49) was higher in spite of a smaller N-NH₃ concentration (69 mg/l). The total volatile fatty acid concentration was lower (49 mmole/l), but the molar percentage of acetic acid (69 %) was very high.

According to the results obtained, the caecum content seems to be less variable than the rumen content during the 24hr-cycle.

Références bibliographiques

- ARGENZIO R. A., SOUTHWORTH M. et STEVENS C. E., 1974. Sites of organic acid production and absorption in the equine gastro-intestinal tract. *Am. J. Phys.*, **226**, 1043-1050.
- CANDAU M., VIGROUX Ph., 1974. Mécanisme de l'hypermotilité cæcale liée au repas chez le cheval. *C. R. Soc. Biol.*, **168**, 893-899.

- HINTZ H. F., HOGUE D. E., WALKER E. F. (Jr.), LOWE J. F., SCHRYVER H. F., 1971a. Apparent digestion in various segments of digestion tract of ponies fed diets with varying roughage grain ratios. *J. Anim. Sci.*, **32**, 245-248.
- HINTZ H. F., ARGENZIO R. A. et SCHRYVER H. F., 1971b. Digestion coefficients blood glucose levels and molar percentage of volatil acids in intestinal fluid of ponies fed varying forage grain ratios. *J. Anim. Sci.*, **33**, 992-995.
- HINTZ H. F., SCHRYVER H. F., 1972. Nitrogen utilisation in ponies. *J. Anim. Sci.*, **34**, 592-595.
- KERN D. L., SLYTER L. L., WEAVER J. M., LEFFEL E. C., SAMUELSON G., 1973. Pony caecum VS steer rumen, the effect of oats and hay on the microbial ecosystems. *J. Anim. Sci.*, **37**, 463-469.
- KOLB E. et GÜRTLER M., 1971. *Ernährungsphysiologie der Landwirtschaftlichen Nutztiere*. G. Fisher Verlag, Jena, 309-316.
- ROBINSON D. W., SLADE L. M., 1974. The current status of knowledge on the nutrition of equine. *J. Anim. Sci.*, **39**, 1045-1049.
- RUCKEBUSCH Y., VIGROUX Ph., CANDAU M., 1976. Analyse du comportement alimentaire chez les équidés. *Journées d'étude des recherches sur les équidés* (Paris 10 mars 1976). Journées du C.E.R.E.O.P.A.
- TISSERAND J. L., 1975. Contribution à l'étude de la digestion dans le caecum du cheval. *Journées d'étude des recherches sur les équidés*. (Paris 5 mars 1975). Journées du C.E.R.E.O.P.A.
- ULYATT M. J., DELLOW D. W., REID C. S. W., BAUCHOP T., 1975. Structure and function of the large intestine of ruminants. *Proc. IVth International Symposium of Ruminant Physiology*, Sydney Australia. August 1974, 119-133.